



Cette lettre regroupe la sélection (de février à novembre 2012) des revues systématiques et méta-analyses Cochrane publiées dans le domaine dermatologique. Elle comporte les titres, les objectifs et les conclusions des revues. Sa publication a lieu entre deux et quatre fois dans l'année.

Cette lettre a été élaborée par le Satellite Français du Cochrane Skin Group, en partenariat avec la Société Française de Dermatologie et l'association Recommandations En Dermatologie.

Si un de vos collègues souhaite s'abonner à cette lettre d'information, il peut inscrire sur le site internet du :

[Centre Cochrane Français](#)

Contact :

Satellite Français du Cochrane Skin Group : Dr Laurence Le Cleach (laurence.le-cleach@hmn.aphp.fr)

---

## Traitement du mycosis fongoïde

**OBJECTIFS :** Evaluer les effets des traitements du mycosis fongoïde à tous les stades de la maladie.

**CONCLUSION DES AUTEURS:** Cette revue a identifié des données d'essais pour un certain nombre de traitements topiques et systémiques du mycosis fongoïde. En raison de l'hétérogénéité substantielle du design des essais inclus, de leur petite taille, et de leur faible qualité méthodologique, l'efficacité et la tolérance de ces interventions n'ont pas pu être comparées.

En prenant en compte, les effets secondaires graves et le peu de données d'efficacité disponibles, les traitements topiques sont recommandés en première ligne tout particulièrement dans les stades précoces de la maladie. Des schémas thérapeutiques plus agressifs peuvent apporter une amélioration ou une disparition des lésions mais également plus d'effets secondaires. Ils doivent donc être envisagés avec prudence. Des études incluant un nombre plus important de malades avec des critères de jugement clairement définis pour tous les stades du mycosis fongoïde et centrés sur la tolérance, la qualité de vie, et la durée de la rémission sont nécessaires.

Weberschock Tobias, Strametz Reinhard, Lorenz Maria, Röllig Christoph, Bunch Charles, Bauer Andrea, Schmitt Jochen. Interventions for mycosis fungoides. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD008946. DOI: 10.1002/14651858.CD008946.pub2

## Traitements topiques des verrues cutanées

**OBJECTIFS:** Evaluer l'efficacité des traitements locaux des verrues cutanées (hors verrues génitales) chez l'enfant et l'adulte en bonne santé, immunocompétents.

**CONCLUSIONS DES AUTEURS:** Les données de deux nouveaux essais comparant l'acide salicylique à la cryothérapie permettent une meilleure évaluation de leur efficacité. Le niveau de preuve reste le plus probant pour l'acide salicylique mais ne montre cependant qu'un effet thérapeutique modeste.

Au total, les essais comparant la cryothérapie au placebo ne montraient pas de différence significative pour l'efficacité mais ceci est également le cas pour les essais comparant cryothérapie et acide salicylique. Un seul essai montrait que la cryothérapie était plus efficace que l'acide salicylique et le placebo et ce uniquement pour les verrues des mains. Les effets secondaires tel que douleur, lésion bulleuse, et cicatrice n'étaient pas bien rapportés mais sont probablement plus fréquents avec la cryothérapie. Aucun des autres traitements de cette revue n'apparaît mieux toléré ou plus efficace que l'acide salicylique ou la cryothérapie. Deux essais évaluant le ruban adhésif (duct tape) n'ont pas démontré de supériorité par rapport au placebo. Le dinitrochlorobenzène (et potentiellement d'autres allergènes de contact) pourrait être utile pour le traitement des verrues réfractaires.

Kwok Chun Shing, Gibbs Sam, Bennett Cathy, Holland Richard, Abbott Rachel. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD001781. DOI: 10.1002/14651858.CD001781.pub3

## Préparations topiques pour la prévention des vergetures au cours de la grossesse

**OBJECTIFS :** Évaluer les effets des préparations topiques dans la prévention des vergetures lors de la grossesse.

**CONCLUSIONS DES AUTEURS :** Nous n'avons trouvé aucune donnée de bonne qualité étayant l'usage d'une préparation topique dans la prévention des vergetures au cours de la grossesse. Il y a à l'évidence besoin de réaliser des essais randomisés robustes, rigoureux méthodologiquement et portant sur un plus grand nombre de patientes, pour évaluer les effets des préparations topiques sur l'apparition des vergetures au cours de la grossesse. Il est également important que les préparations couramment utilisées par les femmes pour prévenir et traiter les vergetures soient évaluées par des essais randomisés robustes, rigoureux méthodologiquement et de puissance statistique adéquate.

Miriam Brennan, Gavin Young, Declan Devane. Topical preparations for preventing stretch marks in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD000066. DOI: 10.1002/14651858.CD000066.pub2

## Traitements du lichen plan érosif affectant les muqueuses

**OBJECTIVES:** Evaluer les effets des traitements dans la prise en charge du lichen plan érosif touchant les régions buccale, anogénitale, et oesophagienne.

**CONCLUSIONS DES AUTEURS :** Cette revue suggère qu'il n'y a que peu de preuve de l'efficacité pour l'ensemble des traitements du lichen plan érosif de la muqueuse buccale et aucune pour le lichen plan érosif génital. Des essais randomisés contrôlés à plus large échelle sont nécessaires incluant des patients ayant un lichen érosif buccal et génital. Nous suggérons que les futures études devraient avoir des variables d'évaluation standardisées et cliniquement importantes pour les individus atteints. Nous recommandons la mesure d'un score de sévérité clinique et d'un score d'évaluation des symptômes par le patient utilisant des scores de sévérité validés. Nous recommandons également le développement d'un score combiné de sévérité valable à la fois pour les patients ayant une atteinte orale et génitale.

Cheng Suzanne, Kirtschig Gudula, Cooper Susan, Thornhill Martin, Leonardi-Bee Jo, Murphy Ruth. Interventions for erosive lichen planus affecting mucosal sites. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD008092. DOI: 10.1002/14651858.CD008092.pub2

## Vaccins pour la prévention du zona chez les patients âgés

**OBJECTIFS:** Evaluer l'efficacité et la tolérance de la vaccination pour la prévention du zona chez les patients âgés.

**CONCLUSIONS DES AUTEURS :** Le vaccin anti VZV est efficace dans la prévention du zona. Bien que le bénéfice soit plus important chez le groupe de patients les plus jeunes (60-69 ans) c'est également dans ce groupe d'âge que sont observés les effets secondaires les plus nombreux. D'une façon générale, le vaccin est bien toléré, il engendre peu d'effets secondaires systémiques et des effets secondaires d'intensité légère à modérée au site d'injection.

Anna MZ Gagliardi, Brenda Nazaré Gomes Silva, Maria R Torloni, Bernardo GO Soares. Vaccines for preventing herpes zoster in older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD008858. DOI: 10.1002/14651858.CD008858.pub2

## Chirurgie micrographique de Mohs versus exérèse chirurgicale des carcinomes basocellulairesperiorbitaires

**OBJECTIFS:** L'objectif de cette revue était de comparer l'efficacité, le coût, les complications et l'acceptabilité des carcinomes basocellulaires péri oculaires opéré soit par chirurgie micrographique de Mohs soit par exérèse chirurgicale.

**CONCLUSIONS DES AUTEURS :** Il n'a pas été possible de déterminer de manière fiable si une des deux méthodes (chirurgie micrographique de Mohs ou exérèse chirurgicale) permettaient d'obtenir un taux plus faible de récurrences ou de complications dans le traitement des carcinomes basocellulaires péri oculaires. Aucune étude comparant directement le coût des deux méthodes n'a été trouvée. Des essais contrôlés randomisés de bonne qualité sont nécessaires pour améliorer le niveau de preuve de la prise en charge.

Narayanan Krishnamoorthy, Hadid Omar H, Barnes Eric A. Cochrane Database of SystematicReviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD007041. DOI: 10.1002/14651858.CD007041.pub3

## Antagonistes des récepteurs H2 dans l'urticaire

**OBJECTIFS:** Evaluer la tolérance et l'efficacité des antagonistes des récepteurs H2 dans le traitement de l'urticaire

**CONCLUSIONS DES AUTEURS :** Les éléments de preuves très limitées obtenus dans cette revue étaient basés sur quelques vieux essais d'assez petite taille classés comme ayant un risque de biais haut ou peu clair. La revue n'autorise donc pas à ce jour de prise de décision sur l'utilisation des antagonistes des récepteurs H2 dans l'urticaire. Bien que certaines de ces études rapportaient une mesure de l'amélioration des symptômes d'urticaire et une amélioration clinique plutôt minime chez certains participants, le niveau de preuve est faible et non fiable. Nous avons mis l'accent dans cette revue sur le manque de précision et les limites des données rapportées.

FedorowiczZbys, van Zuuren Esther J, Hu Nianfang. Cochrane Database of SystematicReviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD008596. DOI: 10.1002/14651858.CD008596.pub2

---

Ce document regroupe la sélection semestrielle des revues systématiques et méta-analyses Cochrane publiées dans le domaine dermatologique. Cette liste comporte les titres, les objectifs et les conclusions des revues.

Désinscription : Si vous souhaitez ne plus recevoir ce communiqué, veuillez vous désabonner sur le site du Centre Cochrane Français : <http://www.cochrane.fr/>

Ce message est envoyé automatiquement. Merci de ne pas y répondre.